

## CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI NELL'INFANZIA

**in rosso:** ciclo vaccinale consigliato

**in verde:** consigliato in casi particolari

**in blu:** eseguite presso gli ambulatori vaccinali ASL su bambini a rischio (tra parentesi il n° riferimenti riportati in basso); **SI RACCOMANDA DI CONSULTARE IL PEDIATRA DI FAMIGLIA IN CASO DI DUBBI E PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI RISCHIO DEL PROPRIO BAMBINO**

Vaccinazione contro	0-30 gg	3° mese	5° mese	7° mese	11° mese	12° mese	13° mese	15° mese	5 - 6 anni	12 - 16 anni
Difterite (D), tetano (T), pertosse (P) acellulare		DTPa	DTPa		DTPa				DTPa	dT
Poliomielite (IPV)		IPV	IPV		IPV				IPV	
Epatite B (*1)	EpB	EpB	EpB		EpB					
Haemophilus b		Hib	Hib		Hib					
Morbillo (M) , parotite (P), rosolia (R) (*2)							MPR		MPR 2a dose	MPR 2a dose (eventuale)
Varicella (V) (*3)									V	
Meningococco C (*4)								MENC		
Papilloma virus (HPV) (*5)										HPV
Influenza stagionale						Influenza				
Pneumococco (PCV13) (*6)		PCV 13	PCV 13					PCV 13		
Epatite A (*7)						Epatite A				

(\*1) Vaccinazione contro Epatite B: viene anticipata rispetto a quanto previsto dal calendario nei figli di madri positive al virus dell'epatite B (Hbs Ag positive)

(\*2) Vaccinazione anti Morbillo Parotite Rosolia : eventuale seconda dose tra 12 e 16 anni nei casi in cui non sia stata eseguita come prescritto, all'età di 5/6 anni

(\*3) In seguito a indicazione del pediatra in casi di rischio, il vaccino contro la varicella può essere somministrato singolarmente o abbinato a quello contro morbillo-parotite-rosolia (MPR)

(\*4) Se la vaccinazione viene effettuata tra i 12 mesi ed i 18 anni è sufficiente una unica somministrazione (proposto in associazione con l'MPR). Può essere effettuato su richiesta del pediatra o del genitore prima del 12° mese: in questo caso il ciclo vaccinale prevede tre dosi

(\*5) Solo nelle bambine, nel corso del 12° anno di vita , per la prevenzione del tumore della cervice uterina

(\*6) Può essere somministrato in associazione alle prime due dosi dell'esavalente (vaccinazioni riportate sopra in tabella in rosso al 3° e 5° mese) oppure dopo l'anno di vita. In questo caso è sufficiente una sola dose.

(\*7) Vaccino contro l'epatite A per rischio associato ad esposizione in aree geografiche ad alta endemia (es viaggi in paesi a rischio)

I pediatri di famiglia consigliano la vaccinazione contro il rotavirus entro i 6 mesi di età .  
la vaccinazione è eseguibile su richiesta del genitore presso il pediatra (prestazioni a pagamento)