

CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI NELL'INFANZIA

in rosso: ciclo vaccinale **RACCOMANDATO**

in verde: consigliato in casi particolari

in blu: eseguite presso gli ambulatori vaccinali ASL su bambini a rischio (tra parentesi il n° riferimenti riportati in basso); **SI RACCOMANDA DI CONSULTARE IL PEDIATRA DI FAMIGLIA IN CASO DI DUBBI E PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI RISCHIO DEL PROPRIO BAMBINO**

Vaccinazione contro	0-30 gg	3° mese	5° mese	7° mese	11° mese	12° mese	13° mese	15° mese	5 - 6 anni	12 - 16 anni
Difterite (D), Tetano (T), Pertosse (P) acellulare		DTPa	DTPa		DTPa				DTPa	dTpa
Poliomielite (IPV)		IPV	IPV		IPV				IPV	
Epatite B (*1)	EpB	EpB	EpB		EpB					
Haemophilus b		Hib	Hib		Hib					
Pneumococco (PCV13)		PCV 13	PCV 13		PCV13	PCV13 (*2)				
Morbillo (M) , Parotite (P), Rosolia (R) (*3)							MPR		MPR 2a dose	MPR 2a dose (eventuale)
Varicella (V) (*4)							Varicella			
Meningococco C (*5)							MENC			
Papilloma virus (HPV) (*6)										HPV
Influenza stagionale				Influenza						
Epatite A (*7)						Epatite A				

(*1) Vaccinazione contro Epatite B: viene anticipata rispetto a quanto previsto dal calendario nei figli di madri positive al virus dell'epatite B (Hbs Ag positive)

(*2) Nei casi in cui non sia stata eseguita, come raccomandato, a partire dal terzo mese di vita: se iniziata nel secondo anno di vita devono essere eseguite due dosi, nel terzo anno di vita una sola dose.

(*3) Vaccinazione anti Morbillo Parotite Rosolia : eventuale seconda dose tra 12 e 16 anni nei casi in cui non sia stata eseguita, come raccomandato, all'età di 5/6 anni

(*4) Su indicazione del pediatra o invito dell'ASL in bambini appartenenti a categorie a rischio

(*5) Se la vaccinazione viene effettuata tra i 12 mesi ed i 18 anni è sufficiente una unica somministrazione (proposto in associazione con l'MPR). Può essere effettuato su richiesta del pediatra o del genitore prima del 12° mese: in questo caso il ciclo vaccinale prevede tre dosi

(*6) Solo nelle bambine, nel corso del 12° anno di vita , per la prevenzione del tumore della cervice uterina

(*7) Vaccino contro l'epatite A per rischio associato ad esposizione in aree geografiche ad alta endemia (es viaggi in paesi a rischio)

I pediatri di famiglia consigliano la vaccinazione contro il rotavirus entro i 6 mesi di età .
la vaccinazione è eseguibile su richiesta del genitore presso il pediatra (prestazioni a pagamento)